

liposic®

Carbomer 980

نام تجاری

Liposic®

نام ژنریک

کربومر ۹۸۰

دسته دارویی

اشک مصنوعی

ساختمان شیمیایی

کربومر ۹۸۰ (۲۰۰ mg/۱۰۰ g)، ستریماید، سوربیتول، زنجیره تری گلیسرید متوسط، سدیم هیدروکساید، آب خالص

اشکال دارویی

ژل چشمی ۱۰ گرمی

مکانیسم اثر

پوشش دهنده هر سه لایه اشک

موارد مصرف

- خشکی چشم متوسط تا شدید
- جلوگیری از بروز علائم خشکی چشم هنگام بیدار شدن از خواب در افرادی که با عدم بسته شدن کامل پلکها در خواب مواجه هستند.

عوارض جانبی

تاری دید

تداخلات دارویی

فاصله زمانی بین استفاده از لیپوزیک و هر قطره چشمی دیگر باید حداقل ۱۵ دقیقه باشد.

مصرف در حاملگی و شیردهی

گروه C

هشدار

- بهتر است در زمان استفاده، لنزهای تماسی از چشم خارج شوند.
- تا ۵ دقیقه پس از استفاده از دارو، از رانندگی کردن خودداری شود.
- پس از گذشت یک ماه از باز شدن در تیوب، از مصرف آن خودداری شود.

شرایط نگهداری

در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

